花包于尿道口 。接觸于局部之手

則惟入目中。即病胀睛。 。以待醫生診查。

證保實切有用信求務版出

往入獎准。通常應用四百倍至五十倍之蛋白 注射過早。則後日當有反而之**處**。體起副睾丸炎膀胱 ·不可間斷。即分泌物已止之後。仍宜持續一二週。 欲行注射時 。 官將容樂被之注射器 。 向上 縣進 炎症之刺激症狀。不甚劇烈時。可行尿道注射法

吳江女兒行

水盈盈寒水曬。曼聲低唱斷腸曲。 曲訴心頭事。分明道去相思字。 有女貌如花。解凍溪邊獨浣紗 計解卿愁。翩然笑傲湖山色 只断腸各の愉懷不禁青衫濕。

三九四三六路電

(乙)門診一元

(戊)急病

(丁)膏丸方四元

丙) 出診四元

第

即 八 一 第
(日二十月二年九十國民)
《分 二 洋 售 份 每 ▶
山路前書路馬三海上址館
。

醫士楊志一著

双之策

是以陽明下

级保收如有标识的影响。

IN.

礬

×××

。 谷 購 洞 元

水酒谷

个報發行部啓事 行部啓事

会议以次文章文章

。病從小便出。遊無潤通大便之文。

散

之。是性湯劑。初川尤藍 火暖痛暖腫喉間糜爛。吹 沈熊琳

稿投迎都

N.

陰吹治法叢考 **²********************